

Formulario de Consentimiento
Para la Prevención y Tratamiento de la Tuberculosis

Querido/a Cliente:

Le queremos informar sobre su tratamiento, los efectos secundarios, y los riesgos que puede tener al tomar los medicamentos de la tuberculosis.

Tratamiento:

El tratamiento que las personas con tuberculosis toman, previene que la infección de la tuberculosis se convierta en una enfermedad activa en la mayoría de los casos. El tratamiento con medicamentos adicionales que es designado para personas con enfermedad activa, detiene y en la mayoría de los casos cura la tuberculosis. Los medicamentos deben ser tomados todos los días desde cuatro meses a un año (depende de la recomendación del doctor). Los medicamentos y la supervisión médica se le ofrece sin costo alguno.

| MEDICAMENTOS | EFEKTOS SECUNDARIOS | COMENTARIOS |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> INH Isoniazid | Orina Obscura, excrementos de color claro, fatiga, pérdida del apetito, ojos o piel amarillenta, irritación en la piel | El riesgo de contraer la Hepatitis aumenta con la edad y consumo de alcohol, el uso de acetaminafén (Tylenol, por ejemplo). |
| <input type="checkbox"/> RIF Rifampin | Dolor de estómago, irritación de la piel, orina oscura o anaranjada, excrementos de color claro, ojos y piel amarillenta, síntomas de gripe, fatiga. | Hay interacción fuerte entre este medicamento y Metadone, pastillas anticonceptivas y otros medicamentos. Hace anaranjados los líquidos del cuerpo (sudor, orina, lágrimas). También descolora los lentes de contacto. |
| <input type="checkbox"/> PZA Pyrazinamide | Dolor de conyunturas, dolor de estómago, irritación de la piel, orina oscura, excrementos de color claro, ojos y piel amarillenta, fatiga. | Elevados niveles de ácido úrico. Evite el consumo de alcohol. Beba mucho líquidos. |
| <input type="checkbox"/> EMB Ethambutol | Diminución de la capacidad de diferenciar los colores verde y rojo, disminución de la vista, irritación de la piel. | Este medicamento no se recomienda en niños tan pequeños que no se pueda determinar cambios en la visión a menos que la tuberculosis sea resistente a las otras drogas. |
| <input type="checkbox"/> SM Streptomycin | Pérdida del oído incluyendo sonidos timbrales y de roramiento. | Este medicamento es inyectado. Evite or reduzca la dosis en adultos mayores de 60 años. |

Yo he leído la información en este formulario sobre los tratamientos de la tuberculosis. Yo he tenido la oportunidad de hacer preguntas las cuales fueron contestadas a mi satisfacción. Yo entiendo los beneficios y riesgos de los medicamentos y doy consentimiento y/o pido que me los den o que se los den a la persona cuyo nombre esta escrito abajo y del cual soy padre, guardian, o persona autorizada para firmar.

Nombre

Fecha de hoy

Firma

Testigo